



En 2013 des prix en baisse !

Certains animaux nécessitent une alimentation spécifique diététique

qui peut parfois s'avérer coûteuse. En renégociant avec les fournisseurs, nous pouvons proposer une baisse durable des prix de ce type de croquettes : pour 2 sacs achetés ensemble, une baisse de 10% est immédiatement appliquée.

Aliments concernés par la baisse de prix :

- sacs de 12 à 14kg pour chien,
 - Hypoallergénique, Gastrointestinal, Mobility, Urinary, Satiety, Obesity : pour tout autre aliment, nous demander.
- A commander 48h à l'avance.



Grande campagne de dépistage FeLV/FIV

Votre chat présente-t-il un risque d'être infecté ?

Les contacts rapprochés, tels que les accouplements ou les bagarres avec d'autres chats, sont des situations à risque pendant lesquelles votre chat peut être contaminé par les virus FeLV ou FIV.

Il peut suffire d'un unique contact pour que la transmission ait lieu. Les chats séropositifs peuvent ne présenter aucun signe pendant des mois, voire plusieurs années, ne développant des signes cliniques sévères que plus tard dans leur vie.

« Espérance de vie d'un chat qui sort :
non stérilisé et non vacciné = 3-5 ans
vacciné et stérilisé = 15 ans ! »

Dans quels cas réaliser le test :

- chat avec accès à l'extérieur
- blessures ou abcès
- contact avec d'autres chats
- adoption récente
- chat non stérilisé
- chat fatigué, perte de poids ou manque d'appétit
- mauvaise guérison de ses plaies ou abcès

Qu'est-ce que la Leucose (FeLV) ?

La leucose se traduit par l'apparition de tumeurs et/ou d'une immunodépression progressive (baisse des défenses immunitaires entraînant des infections). Des vaccins efficaces pour protéger votre chat de la leucose féline existent.

Qu'est-ce que le Sida du chat (FIV) ?

Le sida du chat endommage le système immunitaire, rendant le chat plus fragile aux infections. Le FIV n'est pas transmissible à l'Homme ! Il n'existe malheureusement pas de vaccin protégeant les chats contre cette maladie.

Le diagnostic précoce est essentiel

Les chats contaminés peuvent vivre de nombreuses années. La prise en charge vétérinaire adéquate leur permettra de vivre en meilleure santé, plus longtemps et d'éviter de transmettre ces maladies.

Demandez-nous de tester votre chat dès aujourd'hui.

Le test ne nécessite que quelques gouttes de sang et le résultat est disponible après 7 minutes seulement.

MEILLEURS VOEUX

Toute l'équipe de la clinique en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013 !



Aux petits soins pour ses griffes et coussinets !

Les coussinets des chiens et chats jouent entre autres un rôle **amortissant et isolant**. Ils sont mis à rude épreuve entre le passage d'une pièce surchauffée à une rue glaciale, et lors d'escapades aux sports d'hivers avec neige et sel de déneigement.

Au retour d'une promenade sur un sol sableux ou boueux, n'hésitez pas à **rincer à l'eau claire** les pattes de votre chien, de même qu'après une sortie en hiver, lorsqu'il gèle et que du sel de déneigement a été répandu sur le sol : ce sel provoque en effet des irritations. Chez les chiens à poil long, il faut **enlever régulièrement les bourres de poils** qui se logent entre les doigts.

Si votre chien est fragile des coussinets ou avant un départ à la montagne ou à la chasse, pensez à appliquer une **solution tannante** 10 à 15 jours avant le départ, afin d'épaissir ses coussinets tout en préservant leur souplesse. Graissez

les coussinets avec de la vaseline ou du Biobalm® avant de le faire marcher dans la neige.

Des **griffes trop longues** peuvent blesser les coussinets plantaires. Leur pousse exagérée résulte d'un manque d'exercice et/ou de mauvais aplombs. Elle est également fréquente chez l'animal âgé. Il faut alors les couper, sans oublier l'ergot. La griffe ne doit pas être coupée trop court, car cela est douloureux pour l'animal.



Stériliser un furet ou une furette avec un implant, c'est possible?

L'implant : une alternative à la stérilisation chirurgicale

L'implant peut aujourd'hui être envisagé par les propriétaires de furet, qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle, comme une alternative réversible à la stérilisation chirurgicale. Comment fonctionne ce mode de stérilisation, quels en sont les effets, les avantages et les inconvénients ?

Le Suprelorin® est un implant contenant un analogue de synthèse de la GnRH, une



hormone qui régule la libération des hormones sexuelles. La libération continue de cet analogue entraîne une inhibition de la libido, une régression des organes génitaux externes, une inhibition de la spermatogénèse chez le mâle et une diminution des taux sanguins des hormones sexuelles. Les effets sont réversibles.

Pourquoi faire stériliser son furet ou sa furette?

La furette doit obligatoirement être stérilisée si elle n'est pas reproductrice, car les chaleurs prolongées entraînent chez cette espèce une anémie qui met en danger la vie de l'animal.

Chez le mâle, la stérilisation supprime l'instinct de marquage durant la période de reproduction, permet d'atténuer l'odeur corporelle et est souvent nécessaire pour faire cohabiter plusieurs furets en toute quiétude.

Quand poser un implant à son furet et comment?

On peut implanter à n'importe quel

moment du cycle sexuel. Chez le jeune, on peut l'utiliser à partir de l'âge de 4 à 5 mois, même avant l'apparition de l'activité sexuelle.

L'implant peut être posé sur le furet vigile s'il est calme et coopératif. Chez les sujets turbulents ou en rut, une anesthésie gazeuse flash à l'isoflurane est préférable.

Peut-on renouveler l'implant de son furet et comment?

Il n'est pas nécessaire d'enlever un implant qui arrive au terme de son activité, en raison de son caractère biocompatible. Sa résorption sera d'ailleurs presque complète. La durée estimée des effets contraceptifs est de 1 à 2 ans. En pratique, la pose d'un nouvel implant sera motivée par le retour en chaleur de la femelle et la reprise de l'activité sexuelle du mâle.

Pourquoi un implant plutôt que la stérilisation chirurgicale?

La stérilisation chirurgicale joue un rôle indiscutable dans l'apparition de la maladie surrénalienne chez le furet. En choisissant l'implant, la stérilisation peut être effectuée sans effets secondaires.

Santé du cheval : éviter et agir en cas de coliques

Les chevaux ont un système digestif délicat, les coliques font partie des ennuis courants et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Que faut-il savoir?

Les symptômes qui doivent vous alerter sont : un abattement, une perte d'appétit, des étirements répétitifs, une absence de crottins, de la sudation ou des tremblements. Il arrive également qu'un cheval en colique se couche et se lève fréquemment, regarde son ventre ou se donne des coups de pied dans le ventre, gratte le sol ou se roule.

La prévention

Apprenez à écarter tout ce qui pourrait favoriser cette maladie chez votre cheval. Évitez :

- un changement abrupt de nourriture ou d'habitudes alimentaires
- les rations de mauvaise qualité
- les maladies dentaires (qui empêchent le cheval de mastiquer correctement)
- les vers intestinaux (parasitisme)
- le stress (orages, changements abrupts, transport)

Les causes

Les causes suivantes sont parfois identifiées : une impaction ou constipation, la

présence de gaz ou de sable, de spasmes ou d'ulcères gastriques. Il arrive également qu'une portion de l'intestin se déplace ou provoque une torsion.

En attendant les soins vétérinaires, vous pouvez faire les choses suivantes : surveillez votre cheval, vérifiez qu'il a suffisamment de paille pour se rouler sans se blesser, mettez-lui éventuellement des protections. La meilleure solution est encore de le faire marcher en longe s'il s'agite.

Laissez-lui l'accès à l'eau, bouchonnez-le au niveau du dos et des reins longuement et vigoureusement et couvrez-le.

Traitement

Le traitement dépendra des résultats de l'examen clinique. Les traitements classiques incluent les anti-inflammatoires, les antispasmodiques, les tranquillisants et les perfusions intraveineuses. Parfois, il est nécessaire de recourir à la chirurgie.

Les coliques peuvent être une épreuve stressante pour vous et votre cheval. Nous avons l'habitude de traiter ces problèmes : n'hésitez pas à nous téléphoner en cas de doute. Nous nous efforçons toujours de faire rapidement le diagnostic et de vous donner un pronostic.

